

## **Info 4. Coronaimpfung (2. Boosterimpfung) gemäß STIKO** **Stand 20.09.2022**

**Für folgende Personengruppen wird eine weitere Auffrischimpfung (4. Impfung)** empfohlen, **vorzugsweise mit einem Omikron-adaptierten bivalenten mRNA-Impfstoff**, im Abstand von 6 Monaten zum letzten immunologischen Ereignis (Impfung oder SARS-CoV-2-Infektion):

- a. Personen ab dem **Alter von 60 Jahren**
  
- b. **Personen im Alter ab 12 Jahren mit erhöhtem Risiko** für schwere COVID-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung, insbesondere Immundefizienz
  
- c. **Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen**, insbesondere solche mit direktem PatientInnen- bzw. BewohnerInnenkontakt
  
- d. **BewohnerInnen in Einrichtungen der Pflege**
  
- e. **Personen mit erhöhtem Risiko** für einen schweren Krankheitsverlauf **in Einrichtungen der Eingliederungshilfe**

**Bei besonders gefährdeten Personen** (z.B. Hochbetagte, Personen mit Immundefizienz) **kann** es sinnvoll sein – abhängig von den **bisherigen Antigenkontakten (Impfungen und Infektionen)** und entsprechend der [21. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung](#) – nach dem 4. Ereignis (z.B. 2. Auffrischimpfung) noch eine weitere (d.h. eine 5.) Impfstoffdosis zu verabreichen. Auch hierfür gilt der **6-Monatsabstand** zur letzten Impfung oder Infektion. Die Indikation sollte unter **Berücksichtigung des Gesundheitszustands und des individuellen Erkrankungsrisikos mit ärztlicher Beratung** getroffen werden.